

### PROVA PRATICA 3

- 1) Indicare il riflesso NON utilizzato nell'accertamento della funzione neurologica:**
- a) Riflesso della caviglia
  - b) Riflesso stapediale
  - c) Riflesso patellare
  - d) Riflesso di Babinski
- 2) Le alterazioni del comportamento dei pazienti affetti da esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) possono caratterizzarsi da:**
- a) Tutte le risposte sono corrette
  - b) Agitazione psicomotoria
  - c) Apatia
  - d) Aggressività
- 3) In una persona anziana un arto inferiore accorciato, extraruotato ed addotto può far pensare a:**
- a) Una lussazione dell'anca
  - b) Una frattura del collo del femore
  - c) Una frattura dell'epifisi distale del femore
  - d) Un'artrosi dell'anca
- 4) L' Artrolisi è un intervento indirizzato a :**
- a) Ridurre ROM
  - b) Restituire forza
  - c) Limitare il dolore
  - d) Aumentare ROM
- 5) La manovra di Gower è utilizzata per la diagnosi di:**
- a) Polineuropatia diabetica
  - b) Polimiosite
  - c) Sindrome di Guillain Barré
  - d) Distrofia muscolare di Duchenne
- 6) Un'area fibrotica richiede di essere trattata**
- a) Esclusivamente con il Drenaggio Linfatico Manuale
  - b) Esclusivamente con il bendaggio
  - c) Combinando Drenaggio Linfatico Manuale, bendaggio ed eventualmente supporti specifici sottobendaggio
  - d) Esclusivamente con la pressoterapia ad alta pressione



**7) Quale affermazione è scorretta?**

Una carrozzina pieghevole leggera rispetto ad una pieghevole standard

- a) ha peso minore
- b) ha codici di prescrizione differenti
- c) ha possibilità di maggiore personalizzazione
- d) non viene prescritta ad un utente anziano

**8) Quale di questi consigli NON dareste alla mamma di un neonato?**

- a) Uso dell'ovetto/sdraietta
- b) Promuovere la posizione prona da sveglio
- c) Ricercare lo sguardo e l'inseguimento visivo
- d) Farlo giocare posizionato su un fianco

**9) Nei quadri di patologia cerebellare congenita nel bambino NON è necessario**

- a) Valutare la funzione visiva
- b) Modificare oggetti di uso quotidiano
- c) Trattamento fisioterapico continuativo
- d) Appesantire alcuni distretti corporei

**10) In un programma riabilitativo di un paziente con malattia di Parkinson quale è la strategia corretta da suggerire per girarsi durante il cammino**

- a) Girare compiendo una semicirconferenza e tenendo i piedi ben distanziati tra loro
- b) Far perno su di una gamba sola girando in senso orario
- c) Far perno su di una gamba sola girando in senso antiorario
- d) Ruotare prima il cingolo scapolare e successivamente il cingolo pelvico

**11) Nel trattamento del linfedema NON è indicato:**

- a) Bendaggio decompressivo
- b) Educazione del paziente sulla prevenzione delle infezioni e la cura della cute
- c) Astenersi dall'esercizio fisico
- d) Utilizzo di guaine elasto- compressive

**12) Durante la riabilitazione dopo un infarto acuto del miocardio, i segni e i sintomi che indicano uno sforzo inappropriato del paziente sono:**

- a) Comparsa di angina pectoris
- b) Comparsa di astenia
- c) Sudorazione
- d) Tutte le risposte sono corrette

**13) Cos'è importante nella riabilitazione di un tendine operato?**

- a) Recuperare la forza il più rapidamente possibile
- b) Mobilizzare in protezione di sutura
- c) Mettere in allungamento l'unità miotendinea coinvolta alla seconda settimana
- d) Muovere precocemente all'interno di tutto il ROM



**14) Nell'esecuzione di un programma riabilitativo, il Fisioterapista svolge con autonomia e titolarità:**

- a) Procedure diagnostiche- cliniche
- b) Procedure assistenziali
- c) Procedure di valutazione funzionale
- d) Procedure a supporto dell'assunzione corretta della terapia farmacologica

**15) Nell'attuazione di un programma riabilitativo post- operatorio per artroprotesi totale d'anca si consiglia di evitare di posizionare un cuscino sotto le ginocchia per prevenire:**

- a) Una lussazione posteriore
- b) Una retrazione dei muscoli flessori
- c) Una retrazione dei muscoli estensori
- d) Una trombosi venosa profonda

**16) Se durante la valutazione funzionale di un paziente affetto da ernia discale, lo stesso ha difficoltà a camminare sulle punte è ipotizzabile un'ernia:**

- a) Tra L1-L2
- b) Tra L3-L4
- c) Tra L4-L5
- d) Tra L5-S1

**17) Per valutare la sindrome del piriforme è utile effettuare il test come di seguito riportato:**

- a) Paziente in decubito laterale sul lato opposto a quello affetto; l'arto da esaminare viene portato in flessione, adduzione e rotazione interna dell'anca
- b) Paziente in decubito laterale sul lato da esaminare; l'arto affetto viene portato in flessione, adduzione e rotazione interna dell'anca
- c) Paziente in decubito laterale sul lato opposto a quello da esaminare; l'arto da esaminare viene portato in estensione a ginocchio flesso a 90°
- d) Paziente in decubito laterale sul lato opposto a quello affetto l'arto da esaminare viene portato in estensione a ginocchio esteso

**18) Nel paziente affetto da artrite reumatoide (AR) NON è raccomandato:**

- a) L'idrochinesiterapia
- b) Un training globale, aerobico e combinato con esercizi di rinforza muscolare
- c) L'esercizio ad alta intensità in presenza di grave compromissione articolare
- d) Programmi di economia articolare nell'AR precoce e grave/moderata

**19) Il barrage è un test di valutazione utilizzato nel caso di:**

- a) NSU (negligenza spaziale unilaterale)
- b) Disturbi dell'equilibrio
- c) Afasia
- d) Malattia di Alzheimer



**20) Quale tra i seguenti trattamenti NON fa parte dell'immediato post-operatorio del paziente amputato di arto inferiore:**

- a) Fisioterapia respiratoria
- b) Trattamento dell'edema e della cicatrice
- c) Globulizzazione del moncone
- d) Ripristino dell'equilibrio

