

La risposta corretta è solo una.

Le prime 10 risposte hanno valore di 2 punti, le successive 10 risposte hanno valore di 1 punto per un totale di 30 punti

Le risposte errate non prevedono la decurtazione di punti.

## PROVA 1

- 1) Quale delle seguenti malattie non segue la catena di trasmissione oro/fecale
  - (a) Botulismo
  - (b) Infezioni tifo/paratifiche
  - (c) Epatite A
  
- 2) Quali tra le seguenti malattie è trasmessa per via aerea
  - (a) Epatite B
  - (b) Tetano
  - (c) Meningite
  
- 3) Per prevenzione primaria si intende
  - (a) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana
  - (b) Tutti gli interventi di riabilitazione
  - (c) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia
  
- 4) Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è regolamentato da
  - (a) D.M 69/97
  - (b) D.P.R.225/74
  - (c) LEGGE 502/1992
  
- 5) Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella
  - (a) Dal 3° mese di vita
  - (b) Dal 6° mese di vita
  - (c) Dal 12° mese di vita
  
- 6) I "Livelli Essenziali di Assistenza"(LEA) introdotti con il D.L 502/1992 rappresentano
  - (a) La dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accREDITAMENTO
  - (b) Trattamenti sanitari ripetuti ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
  - (c) Le prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini da parte del SSN
  
- 7) Con il concetto di immunoprofilassi attiva si intende
  - (a) La somministrazione dei vaccini
  - (b) La somministrazione di immunoglobuline
  - (c) La somministrazione di antibiotici
  
- 8) Il test di mantoux si considera positivo quando
  - (a) La sede di inoculazione dell'avambraccio risulti anche solo leggermente arrossata senza infiltrato
  - (b) L'infiltrato risulta uguale o maggiore di 5 mm
  - (c) L'infiltrato risulta pari o maggiore di 2 cm
  
- 9) Quale sede corporea viene utilizzato per le vaccinazioni dei bambini con età inferiore a 12 mesi

- (a) Quadricipite femorale
- (b) Addome
- (c) Gluteo

10) La scheda vaccinale per vaccino a MPRV prevede

- (a) 1 dose
- (b) 3 dosi
- (c) 2 dosi

11) Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tubercolosi, si procede

- (a) A caso
- (b) Per cerchi concentrici
- (c) Non è importante individuare i contatti

12) I DPI previsti per l'effettuazione di un tampone sono:

- (a) Camice monouso impermeabile con manica lunga; guanti monouso, protezione per occhi, Mascherina monouso FFP2/FFP3
- (b) camice; mascherina chirurgica
- (c) Guanti monouso; cuffia per capelli monouso

13) La malaria è

- (a) Una malattia contagiosa
- (b) Una zoonosi
- (c) Una malattia trasmissibile per contatto sessuale

14) Quali sono le fasi della decontaminazione?

- (a) Disinfezione e sterilizzazione
- (b) Pulizia e disinfezione
- (c) Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

15) Ogni quanti anni si effettua il richiamo dT<sub>p</sub> nell'adulto?

- (a) Ogni 5 anni
- (b) Ogni 10 anni
- (c) Ogni 20 anni

16) La documentazione vaccinale va conservata

- (a) Fino alla maggiore età
- (b) Finché è residente
- (c) Per sempre

17) La contaminazione del cibo da parte dei batteri può essere prevenuta

- (a) Effettuando la vaccinazione antitifico-paratifica
- (b) Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti
- (c) Tenendo sempre i guanti

18) I bambini nati da madre HbsAg positiva

- (a) Devono essere sottoposti a vaccinazioni HBV e immunoprofilassi alla nascita e poi seguono lo stesso calendario vaccinale degli altri bambini

- (b) Non devono essere vaccinati perché controindicata
- (c) Seguono lo stesso calendario degli altri bambini

19) L'igiene è

- (a) Una branca della medicina che si occupa dell'assistenza alle persone
- (b) Una scienza che studia solo l'eziologia delle malattie
- (c) Una disciplina che si occupa della salute; essa ha come obiettivo il mantenimento, il potenziamento e la promozione della salute dl singolo individuo e della collettività

20) Qual'è la differenza tra Isolamento e quarantena

- (a) Per isolamento ci si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione e sviluppare i sintomi, mentre per quarantena si intende l'invio obbligatorio dei soggetti malati a controllo specialistico dopo 10 giorni
- (b) L'isolamento è la separazione delle persone infette dalle altre persone., per prevenire la diffusione dell'infezione, mentre la quarantena è la restrizione dei movimenti e la separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione
- (c) L'unica differenza è nella durata della restrizione