

PROVA 3

1) La principale normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro è contenuta:

- a) Nella legge n. 251/2000
- b) Nella legge n. 3/2018
- c) Nel decreto legislativo n. 81/2008
- d) Nella legge n. 626/1994

2) Quale azione svolge il muscolo gran dorsale nei confronti dell'omero?

- a) Flessione
- b) Estensione
- c) Rotazione esterna
- d) Abduzione

3) La Sindrome di Dupuytren è causata da:

- a) Una sindrome irritativa del nervo mediano
- b) Una retrazione della aponeurosi palmare superficiale
- c) Una sindrome irritativa del nervo radiale
- d) Una retrazione della aponeurosi alare

4) Il cheloide è:


- a) Una cicatrice esuberante che copre una superficie maggiore della ferita che l'ha causata
- b) Un'inflammatione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine
- c) Un farmaco antibatterico
- d) Il tratto terminale dell'apparato digerente

5) La disostruzione bronchiale si propone tutti i seguenti obiettivi specifici tranne uno. Quale?

- a) La rimozione delle secrezioni
- b) Il miglioramento degli scambi gassosi a livello polmonare
- c) La riespansione delle zone atelectasiche
- d) L'allungamento delle fibre del diaframma

6) Quale mediatore chimico agisce a livello della giunzione neuro-muscolare?

- a) La serotonina
- b) La noradrenalina
- c) L'acetilcolina
- d) La dopamina



7) Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico di:

- a) Dei fasci piramidali
- b) Della sostanza nera
- c) Del cervelletto
- d) Della corteccia cerebrale

8) L'area motoria primaria, sita nel lobo frontale è:

- a) L'area 1
- b) L'area 4
- c) L'area 6
- d) L'area 8

9) il tendine del capo lungo del bicipite è:

- a) Connesso al polo inferiore del cerchio glenoideo
- b) Intracapsulare e intrasinoviale
- c) Extracapsulare
- d) Intracapsulare ed extrasinoviale

10) Qual è la causa dell'aumento della ICA (infezione correlata all'assistenza) negli ultimi anni in Italia?

- a) Non adeguato lavaggio delle mani
- b) Aumento dei ceppi batterici resistenti
- c) Progressiva introduzione di nuove tecnologie e procedure sanitarie invasive
- d) Tutte le precedenti alternative sono corrette

11) La riduzione della tosse e della dispnea è l'obiettivo primario dell'intervento riabilitativo nei confronti del paziente affetto da:

- a) Asma
- b) Broncopneumopatia cronica ostruttiva
- c) Paralisi del diaframma
- d) Angina pectoris

12) Di cosa può essere una complicanza la lesione del nervo femorale?

- a) Intervento di endoprotesi d'anca
- b) Intervento di ernia a livello L4-L5
- c) Displasia congenita dell'anca
- d) Frattura di femore

13) Il linfodrenaggio manuale è controindicato in caso di:

- a) Elefantiasi
- b) Cicatrici retraenti
- c) Linfangite
- d) Linfedema di II grado



14) Quale tra le seguenti è la frattura a maggior rischio di sviluppare la sindrome di Volkmann?

- a) Polso
- b) Femore
- c) Gomito
- d) Scafoide

15) NON è compresa tra le malattie degenerative del sistema nervoso:

- a) La miastenia gravis
- b) La malattia di Parkinson
- c) La SLA
- d) La paralisi bulbare progressiva

16) Le Paralisi Cerebrali Infantili sono:

- a) Forme cliniche eterogenee caratterizzate da alterazione del movimento
- b) Disordini persistenti ed imm modificabili del movimento e della postura dovuti a lesione progressiva del cervello immaturo
- c) Serie di quadri clinici a varia eziologia ed espressione che hanno in comune disordini del movimento e la non progressività della lesione
- d) Patologie motorie conseguenti ad un insulto cerebrale occorso dopo il secondo anno di età

17) Il "neglect" è un disturbo:


- a) Visivo transitorio e conseguente ad un trauma cranico
- b) Che porta all'incapacità di prestare attenzione agli stimoli provenienti dalla metà dello spazio omolaterale alla lesione
- c) Che porta all'incapacità di prestare attenzione agli stimoli provenienti dalla metà dello spazio controlaterale alla lesione
- d) Che investe la motilità relativa alla parte controlaterale alla lesione

18) Durante la fase di appoggio monopodalico, il piccolo e medio gluteo:

- a) Stabilizzano il bacino
- b) Limitano la caduta in adduzione
- c) Assecondano la rotazione interna indotta dalla rotazione del bacino verso il lato in appoggio
- d) Tutte le precedenti alternative sono corrette

19) A quale articolazione si riferiscono l'apprehension test e il relocation test?

- a) Ginocchio
- b) Caviglia
- c) Spalla
- d) Polso



20) Il “segno del giornale di Froment” indica:

- a) Un disturbo della sensibilità
- b) La presenza di segni atassici
- c) Una lesione del nervo ulnare
- d) Un danno delle aree prefrontali

21) Secondo la classificazione delle lesioni nervose elementari (Seddon), quale tra le seguenti ha la migliore prognosi?

- a) La neuroaprassia
- b) La neurotmesi
- c) L'assonotmesi
- d) La rottura

22) Qual è la scala di valutazione del danno più usata nelle mielolesioni in base alle indicazioni dell'International Spinal Corde Society (ISCoS)?

- a) La FIM
- b) La SCIM
- c) Il Motricity Index
- d) L'ASIA Impairment Scale

23) Nell'andatura cosiddetta “steppage”

- a) Il paziente extraruota e abduce l'anca a ginocchio esteso
- b) Il paziente appoggia a terra il piede prima con l'avampiede e successivamente con il calcagno
- c) Il paziente esegue una triplice flessione ogni volta che esegue il passo anteriore con l'arto lesa
- d) il piede è bloccato in flessione dorsale

24) Che cosa si intende per fast track?


- a) Il riallenamento allo sforzo
- b) Un tipo di contrazione muscolare
- c) Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione
- d) Una prova di valutazione utilizzata per le PCI

25) La Sindrome di Walleberg è espressione di una lesione localizzata a livello :

- a) Cortico-sottocorticale
- b) Capsulare
- c) Tronco-encefalico
- d) Bulbare

26) In un passo la fase di oscillazione impegna percentualmente circa:

- a) Il 20% del ciclo
- b) Il 60% del ciclo
- c) Il 40% del ciclo
- d) Il 70% del ciclo



27) Le forme di aprassia:

- a) Non sono in alcun modo trattabili
- b) Sono affrontate dai neurologi, che mettono a punto terapie farmacologiche efficaci
- c) Possono vedere una collaborazione tra le varie figure professionali nell'ambito delle cerebrolesioni o di altre patologie
- d) Non vengono valutate dai neuropsicologi ma solo dai fisioterapisti

28) Quale dei seguenti lobi cerebrali è deputato alle funzioni mnesiche?

- a) Frontale
- b) Parietale
- c) Limbico
- d) Temporale

29) Dal punto di vista teorico, il recupero dopo una lesione cerebrale è possibile grazie:

- a) Al fenomeno della ridondanza
- b) Alla plasticità cerebrale
- c) Alla possibilità di vicariamento da parte delle regioni attigue alla lesione
- d) Tutte le precedenti alternative sono corrette

30) Cosa si intende per studio RCT?

- a) Uno studio osservazionale di coorte
- b) Uno studio Ecologico (di correlazione)
- c) Una revisione sistematica
- d) Uno studio prospettico che misura l'efficacia di un nuovo trattamento o intervento

