

## PROVA 2

### 1) Che cosa è l'International Classification of Functioning?

- a) La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del funzionamento
- b) La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
- c) La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della Salute**
- d) La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattie

### 2) WT Test del cammino:

- a) E' un esame invasivo
- b) Non presenta alcuna controindicazione
- c) Permette di valutare la capacità di esercizio e la tolleranza allo sforzo**
- d) Permette di valutare la Capacità Vitale

### 3) Gli esercizi di Codman sono utilizzati per la rieducazione di:

- a) Spalla**
- b) Colonna Cervicale
- c) Colonna Lombare
- d) Anca

### 4) La Spina Bifida è:

- a) Una patologia esclusivamente ortopedica
- b) Una patologia demielinizzante
- c) Una malattia autoimmune
- d) Una malformazione congenita**

### 5) Secondo la Legge n.43/ 1999 *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* il campo proprio di attività e responsabilità del Fisioterapista è definito dal combinato disposto dai seguenti regolamenti:

- a) Profilo professionale, CCNL, codice deontologico
- b) Profilo professionale, CCNL, ordinamenti didattici di base e post base,
- c) Profilo professionale, Codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post base**
- d) Profilo professionale, regolamenti ordinistici

**6) NON è compresa tra le malattie degenerative del sistema nervoso:**

**a) La miastenia gravis**

b) La malattia di Parkinson

c) La SLA

d) La paralisi bulbare progressiva

**7) Durante il fisiologico sviluppo del controllo posturale nel bambino, il controllo della testa avviene normalmente:**

**a) Dal secondo mese di vita**

b) A 9 mesi

c) Da 6-8 mesi

d) Nel primo mese di vita

**8) Una contrazione durante la quale rimane costante la tensione muscolare mentre aumenta la lunghezza del muscolo è detta:**

**a) Eccentrica**

b) Isometrica

c) Concentrica

d) Pliometrica

**9) La Macchina della tosse è:**

a) Una macchina per la ventilazione passiva

**b) Un apparecchio per l'Insufflazione-esufflazione meccanica, indicata per la rimozione delle secrezioni tracheobronchiali**

c) Un apparecchio per inibire il riflesso della tosse

d) Una macchina per sostenere l'espiazione forzata

**10) I legamenti crociati:**

a) Sono intrarticolari ed intrasinoviali

b) Sono extrarticolari ed extrasinoviali

**c) Sono intrarticolari ed extrasinoviali**

d) Sono extrarticolari ed intrasinoviali

**11) La Sclerosi Multipla è una patologia che danneggia:**

- a) Il 1° e 2° motoneurone
- b) Il 2° motoneurone
- c) Le meningi

**d) La mielina**

**12) Il consenso alle prestazioni sanitarie:**

- a) E' valido solo se raccolto scritto in presenza di un testimone
- b) Deve essere raccolto previa completa informazione da parte del professionista sanitario e riportato nella cartella clinica**
- c) Non è necessario raccogliere il consenso informato per prestazioni riabilitative
- d) E' valido solo se riportato su appositi moduli e formulari

**13) Secondo la pratica clinica basata su prove di efficacia (EBP), le decisioni cliniche devono essere prese sulla base di:**

- a) Esperienza del clinico, evidenze scientifiche e valori/preferenze del paziente**
- b) Esperienza del clinico, evidenze scientifiche
- c) Esperienza del clinico, evidenze scientifiche e valori/preferenze del clinico
- d) Esperienza del clinico e Valori/preferenze del paziente

**14) Cosa si intende per studio RCT?**

- a) Uno studio osservazionale di coorte
- b) Uno studio Ecologico (di correlazione)
- c) Una revisione sistematica
- d) Uno studio prospettico che misura l'efficacia di un nuovo trattamento o intervento**

**15) Quale dei seguenti NON è uno degli obiettivi della riabilitazione del paziente affetto da amputazione in fase immediatamente post-operatoria?**

- a) Mantenimento/ recupero ROM articolare
- b) Addestramento all'utilizzo della protesi**
- c) Controllo del dolore
- d) Modellamento e prevenzione edema del moncone

**16) Le linee guida:**

**a) Sono raccomandazioni di comportamento clinico, allo scopo di assistere pazienti e professionisti sanitari nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze**

b) Sono parametro di riferimento e strumento complementare dell'approccio operativo del "percorso del paziente" al fine di un sistematico confronto culturale tra i diversi attori operanti nel percorso assistenziale

c) Sono decisioni di comportamento sottoscritte dai Direttori dell'Azienda e dai pazienti

d) Sono indicazioni di massima per la gestione dei DRG

**17) Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura:**

a) Steppante

b) Falciante

c) Strisciante

**d) Anserina**

**18) In età evolutiva l'indicazione all'utilizzo della carrozzina elettrica:**

a) E' riservata a pazienti con quoziente intellettivo nella norma e nessun deficit sensoriale

b) E' concessa esclusivamente nelle patologie neuromuscolari degenerative

**c) Viene considerata come strumento per promuovere autonomia ed apprendimento**

d) E' riservata ai pazienti con mielomeningocele

**19) L'osteoartrosi delle mani si caratterizza per:**

**a) Noduli di Heberden**

b) Dita a colpo di vento

c) Dita a boutonniere

d) Scomparsa della rima articolare

**20) La sindrome di Morton è dovuta a:**

a) Un osteoma

b) Un'osteite

c) Un' osteocondrite

**d) Un neuroma**

e) Un neurinoma

**21) La displasia congenita dell'anca è:**

- a) Una malformazione a carattere evolutivo dello sviluppo dell'articolazione coxo- femorale**
- b) Una malformazione a carattere evolutivo dello sviluppo della testa del femore
- c) Una lussazione neonatale dell'anca
- d) Una lussazione dell'anca

**22) Nell'ictus cerebrale per diaschisi si intende:**

- a) Il lasso di tempo che intercorre tra l'insorgenza dell'evento acuto e la cronicizzazione dei sintomi motori
- b) La disabilità in fase cronica
- c) Una diminuzione del metabolismo neuronale e del flusso ematico cerebrale causata dalla lesione di una regione cerebrale anatomicamente separata ma funzionalmente correlata**
- d) Una diminuzione del metabolismo neuronale e del flusso ematico cerebrale causata dalla disfunzione/lesione della regione cerebrale interessata dalla lesione

**23) La DISPRASSIA è:**

- a) Un disturbo del movimento finalizzato ad uno scopo**
- b) Un disturbo della forza muscolare
- c) Un disturbo dell'attenzione
- d) Un disturbo del movimento

**24) La resistenza aerobica utile a valutare la capacità funzionale del cammino si misura con:**

- a) Timed up and go Test
- b) Scala di Berg
- c) Six minute walking test**
- d) Dynamic gait index

**25) La rigidità da decerebrazione consiste in:**

- a) Ipertonìa estensoria dei quattro arti**
- b) Flesso-adduzione degli arti superiori e flesso-rotazione interna degli arti inferiori
- c) Ipertonìa flessoria dei quattro arti
- d) Ipotonia con estensione dei soli arti inferiori

**26) Se durante un trattamento riabilitativo il fisioterapista evidenzia una red flag è auspicabile che suggerisca al paziente**

- a) Di sospendere il rinforzo muscolare
- b) Di rivolgersi al personale medico per ulteriori valutazioni**
- c) Di assumere un antinfiammatorio
- d) Di assumere un antidolorifico

**27) La siringomielia è una patologia a carico:**

- a) Del sistema extrapiramidale
- b) Dei nervi periferici
- c) Del midollo osseo
- d) Del midollo spinale**

**28) La sensazione di forte dolore all'appoggio sul moncone in un paziente amputato di arto inferiore è da collegare al fenomeno che va sotto il nome di:**

- a) Causalgia
- b) Neuroma**
- c) Arto fantasma
- d) Claudicatio

**29) Le forme di aprassia:**

- a) Non sono in alcun modo trattabili
- b) Sono affrontate dai neurologi, che mettono a punto terapie farmacologiche efficaci
- c) Possono vedere una collaborazione tra le varie figure professionali nell'ambito delle cerebrolesioni o di altre patologie**
- d) Non vengono valutate dai neuropsicologi ma solo dai fisioterapisti

**30) Una lesione del VII nervo cranico si caratterizza per la paralisi motoria di quasi tutti i muscoli facciali. Insieme ad essa , il paziente riferisce anche:**

- a) Accentuazione del riflesso corneale
- b) Turbe gustative e vegetative**
- c) Nistagmo
- d) Disturbi dell'equilibrio