



La risposta corretta è solo una.

Le prime 10 risposte hanno valore di 2 punti, le successive 10 risposte hanno valore di 1 punto per un totale di 30 punti

Le risposte errate non prevedono la decurtazione di punti.

## PROVA 2

1) L'Istituto Superiore di Sanità è

- (a) Un organo tecnico-scientifico del SSN
- (b) Un'azienda privata
- (c) Un organo privato afferente al Ministero della Salute

2) Gli alimenti più a rischio di tossinfezione da Salmonella sono:

- (a) Verdure grigliate
- (b) Piatti a base di uova e carni di pollame
- (c) Riso bollito

3) Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è regolamentato da

- (a) LEGGE 502/1992
- (b) D.P.R.225/74
- (c) D.M 69/97

4) Per prevenzione primaria si intende

- (a) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana
- (b) Tutti gli interventi di riabilitazione
- (c) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia

5) Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella

- (a) Dal 2° mese di vita
- (b) Dal 10° anno di vita
- (c) Dal 12° mese di vita

6) In paesi a basso livello igienico, quale delle seguenti bevande è sconsigliata per possibile contaminazione microbica

- (a) Bibite con ghiaccio
- (b) Alcolici
- (c) Acqua in bottiglia ben sigillata

7) Con il concetto di immunoprofilassi attiva si intende

- (a) La somministrazione di antibiotici
- (b) La somministrazione di antivirali
- (c) La somministrazione dei vaccini

8) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. è

- (a) A scelta del lavoratore
- (b) Obbligatoria
- (c) Facoltativa per le Aziende



- 9) Il test di mantoux si considera positivo quando
- (a) L'infiltrato risulta pari o maggiore di 2 cm
  - (b) L'infiltrato risulta uguale o maggiore di 5 mm
  - (c) La sedi di inoculazione dell'avambraccio risulti anche solo leggermente arrossata senza infiltrato
- 10) Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tubercolosi, si procede
- (a) A caso
  - (b) Per cerchi concentrici
  - (c) Non è importante individuare i contatti
- 11) I DPI previsti per l'effettuazione di un tampone sono:
- (a) camice; mascherina chirurgica
  - (b) Camice monouso impermeabile con manica lunga; guanti monouso, protezione per occhi, Mascherina monouso FFP2/FFP3
  - (c) Guanti monouso; cuffia per capelli monouso
- 12) Qual'è la differenza tra Isolamento e quarantena
- (a) Per isolamento ci si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione e sviluppare i sintomi, mentre per quarantena si intende l'invio obbligatorio dei soggetti malati a controllo specialistico dopo 10 giorni
  - (b) L'isolamento è la separazione delle persone infette dalle altre persone., per prevenire la diffusione dell'infezione, mentre la quarantena è la restrizione dei movimenti e la separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione
  - (c) L'unica differenza è nella durata della restrizione
- 13) La malaria è causata da:
- (a) protozoi parassiti appartenenti al genere Plasmodium
  - (b) Enterovirus
  - (c) Batteri appartenenti al genere Brucella
- 14) Quali sono le fasi della decontaminazione?
- (a) Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
  - (b) Disinfezione e sterilizzazione
  - (c) Pulizia e disinfezione
- 15) Ogni quanti anni si effettua il richiamo dT<sub>p</sub> nell'adulto?
- (a) Ogni 5 anni
  - (b) Ogni 10 anni
  - (c) Ogni 30 anni
- 16) La documentazione vaccinale va conservata
- (a) Fino alla maggiore età
  - (b) Finchè è residente
  - (c) Per sempre
- 17) Il nuovo concetto di salute secondo l'OMS è
- (a) Capacità di adattamento e autogestione di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive
  - (b) Condizione anomala di un soggetto, causata solo da alterazioni organiche o funzionali che ne compromettano la salute
  - (c) Capacità di adattamento al calore



18) Quale dei seguenti vaccini è raccomandato .in gravidanza?

- (a) Febbre gialla
- (b) Varicella
- (c) Difterite-Tetano-Pertosse

19) I bambini nati da madre HbsAg positiva

- (a) Seguono lo stesso calendario degli altri bambini
- (b) Non devono essere vaccinati
- (c) Devono essere sottoposti a vaccinazioni HBV e immunoprofilassi alla nascita e poi seguono lo stesso calendario vaccinale degli altri bambini

20) In caso di puntura accidentale con ago potenzialmente infetto

- (a) Devono sempre essere somministrate solo le immunoglobuline per il tetano
- (b) Si procede con il follow - up ematologico secondo protocollo per almeno sei mesi
- (c) Non è mai necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore