

COSOMMINISTRAZIONI

VACCINI	INFLUENZA Inattivato/Coltura cellulare/ Alto dosaggio	INFLUENZA adiuvato	PNEUMOCOCCO	ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	COVID 19	dTpa
INFLUENZA Inattivato/Coltura cellulare/Alto dosaggio	NO	NO	SI	SI	SI	SI
INFLUENZA adiuvato	NO	NO	SI	SI*	SI	SI
PNEUMOCOCCO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	SI	SI*	SI	NO	SI	SI
COVID 19	SI	SI	SI	SI	NO	SI
dTpa	SI	SI	SI	SI	SI	NO

- Se non controindicato in scheda tecnica 2 o più vaccini possono essere cosomministrati. RICORDA BENE:
 - se 2 vaccini vivi non vengono cosomministrati, devono essere effettuati ad un intervallo di almeno 4 settimane l'uno dall'altro. È il caso del vaccino influenzale spray nasale e di qualsiasi vaccino vivo attenuato del PNPV.
 - se 2 vaccini inattivati non vengono cosomministrati possono essere effettuati in qualsiasi momento e a qualsiasi distanza di tempo. È il caso del vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e di qualsiasi vaccino influenzale: se non cosomministrati possono essere eseguiti a qualsiasi distanza di tempo.
 - se 1 vaccino vivo attenuato e 1 vaccino inattivato non vengono cosomministrati possono essere effettuati in qualsiasi momento e a qualsiasi distanza di tempo. È il caso del vaccino influenzale spray nasale e di qualsiasi vaccino inattivato del PNPV.
- *In RCP è indicato che il vaccino zoster ricombinante adiuvato può essere cosomministrato con il vaccino antinfluenzale stagionale inattivato e non adiuvato. Sebbene la cosomministrazione con il vaccino antinfluenzale adiuvato non sia specificamente prevista in RCP, i dati disponibili in letteratura e i risultati di diversi studi e trial clinici supportano la possibilità di tale co-somministrazione, evidenziando un profilo di immunogenicità e sicurezza complessivamente rassicurante.